

Capacitación Campesina

CRIA DE POLLOS

Segunda Parte



FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO

COMPONENTE PECUARIO
AREA NORTE - BORBON

REGIONAL ESMERALDAS

CRIA DE POLLOS

Segunda Parte

Contenido: Carlos Caicedo

Ilustraciones: Fernando Barahona Z.

Artes e Impresión: Imprefepp. Telf. 550-705. Quito

Tiraje: 300 ejemplares


Esmeraldas, Marzo del 2000

Compañeros y compañeras
ahora continuaremos
con la cría y engorde
de los pollos.

En esta segunda parte
trataremos sobre
el manejo y cuidado
de los pollos.

Entonces una vez que
hemos visto lo relacionado
con el galpón y los implemen-
tos, veremos como tenemos
que prepararnos desde
que introducimos los pollitos
hasta el momento
del sacrificio y la
comercialización.





Una vez que el galpón está listo, lo primero que debemos hacer es la revisión, de preferencia durante o poco después de un aguacero.


Así estaremos seguros de que:

1. No se nos filtren las goteras por el techo.
2. Que las cortinas queden bien colocadas para la protección de las corrientes de aire.
3. De que contemos con el número de comederos y bebederos necesarios.

4. El galpón y sus alrededores están bien desinfectados, con productos como: **El Vanodine, cal viva, creso o creolina, etc.**

5. La cama, es el sobre-piso que colocamos ya sea de viruta de madera o de balsa.

También podemos utilizar cascarilla de arroz.






Lo ideal es que la cama tenga una altura de 10 cm.

El material debe ser bien regado y uniforme.

6. los alrededores del galpón deben estar bien limpios, sin malezas a ras del suelo, sin basuras ni residuos.

¡Recuerde!

En las malezas, hojas secas, palos, ramas y basuras viven insectos y ratas.



7. Por último:
Antes de guardar a los pollitos debemos encender las lámparas o los focos para calentar el galpón y tener un ambiente adecuado o cálido.



COMPRA DE LOS POLLITOS

Los pollitos se los debe comprar en un almacén de prestigio reconocido, es decir, en un almacén **que nos de garantías.**



De esta manera nos aseguramos de comprar **pollitos de buena calidad.**

Se encarga los pollitos con una semana o quince días de anticipación.

Incluso se deja pagado para estar seguros.




Al comprar los pollitos debemos ver lo siguiente:


Cada caja debe contener el número de pollos pedidos, que se encuentren sanos, vigorosos y fuertes.




Que en lo posible
sean del mismo
tamaño y de color
uniforme.



- Deben tener un día de nacidos.
- Pesar como mínimo 40 gramos cada pollo.
- De preferencia que sean machos




¡Recuerde!




Los pollitos machos crecen y engordan más rápido que las hembras.

El transporte tiene que ser en las mismas cajas de cartón ya que los pollitos vienen bien distribuidos y con buena ventilación.

El traslado hasta nuestra comunidad debe ser en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde, para evitar el exceso de calor durante el transporte.



Debemos estar preparados para protegerlos de la lluvia, del sol fuerte y demasiado viento.



Cuando llegamos a la finca
o a la comunidad hacemos lo
siguiente:


Primero debemos tener:

- Tranquilidad y
- Paciencia



LUEGO

- Debemos colocar
sobre una mesa o
tarima las cajas
con pollos.




- Colocamos los pollos vivos y sanos dentro de la cerca o corral hecho de caña picada, cartón, malla plástica o metálica.

La altura de la cerca debe ser de 60 u 80 cms. de altura y de 1 m. del centro a la redonda (para impedir la entrada de perros y gatos).

- Sacamos uno por uno los pollitos.
- Apartamos los que llegan estropeados y muertos.



- Luego los observamos por unas horas para evitar que se amontonen y se ahogen o se sofoquen.
- Así mismo debemos ver que todos tomen agua.



Dentro del corral los pollitos aprenden a tomar el agua, el alimento junto al calor durante los primeros 15 días.

- Para que tomen el agua debemos preparar agua limpia con azúcar y que sea fresca.
- A los pollitos que no pueden beber el agua los ayudamos.

Para ello les colocamos con la mano unas gotas pero con cuidado para no mojarlos.



Según la distancia o las dificultades que se nos presenten en el traslado debemos actuar para adaptar el organismo de los pollitos y poderles dar el primer alimento.



- No debemos preocuparnos por la comida.

Los pollitos pueden pasar varias horas y hasta un día sólo con el agua azucarada o fresca ya que reponen las energías perdidas en el viaje.

EL ALIMENTO




El primer alimento a dar dependiendo del caso:


- A las 3, 4, 5 ó 6 horas de la llegada de los pollos y luego de haber tomado el agua azucarada.

Para ello, rociamos encima de un pedazo de papel o cartón grueso extendido sobre la cama para motivarlos a comer.

¡Recuerde!

No riegue el alimento encima de la viruta porque los pollitos se pueden atorar.







Seguimos observando a los pollitos, para ver si estos se agrupan debajo de la campana, alrededor de la lámpara, el foco o el mechero, si es así, es porque tienen frío.

Entonces regulamos la campana un poco bajándola, o podemos subir un poco la mecha de la lámpara.

Si vemos que se alejan de la lámpara o fuente de calor es porque tienen demasiado calor.



Tengamos presente que:

De las condiciones que tengan los pollos, depende el consumo del alimento.





Es muy importante conocer la alimentación de los pollos.

Esta consta de 2 etapas.

En cada etapa utilizamos un alimento diferente

¿Cuáles son esas etapas?


La etapa de crecimiento y la etapa de engorde.




En la etapa de crecimiento damos el balanceado de inicio, el cual contiene de 21 a 22% de proteína

Además, contiene energía, fibra, grasa, vitaminas y minerales.

Actualmente en el mercado existen muchas marcas como Nutril, Broiler Inicial, entre otras.






Lo importante es estar seguro de que este primer alimento es completo.

Puede presentarse en forma de harina, pero no muy fina.


También puede venir granulado o quebrado.

El color puede ser diferente entre el balanceado de una casa comercial y otra.


El balanceado se les debe dar a los pollos durante las primeras 4 semanas de vida, o sea dentro de los 28 a 30 días.



¡Recuerde!



No mezcle este alimento con maíz o arroz ya que afectará el crecimiento normal de los pollos.



Para la segunda etapa
de los pollos:

- Debemos dar el balanceado final o de engorde.
- Este alimento contiene de 19 a 20% de proteína.
- Lo damos a los pollos hasta la salida.

La salida o venta está
considerada
desde la sexta semana
a la octava semana
de vida.

Deben tener
de 4 a
6 libras de peso
en este tiempo.





¡Recuerde!



Los pollos de 4 libras se pueden vender a los asaderos.

Los de 5 a 6 libras se venden en las tiendas comedores, restaurantes, tercenas y en el mercado.

La comercialización de los pollos puede ser también en pie o vivos.



Podemos vender pollos sacrificados o enteros, así como se puede hacerlo por libras o por presas.



Debemos buscar la forma de comercializar, teniendo en cuenta el margen de utilidad a obtener, así mismo considerando el gusto del gusto

La comercialización puede ser con terceros.

Pero podemos hacerla en forma directa, sobre todo si trabajamos de manera organizada.



Para la comercialización de los pollos, también debemos tener presente ciertas fechas y épocas de producción como son: las fiestas, reuniones, cursos, mingas, navidad, fin de año, etc.

LA SALUD DE LOS POLLOS

Ahora trataremos sobre
la salud de los pollos.

Hablaremos
de como, mantenerlos
sanos.

En lo posible de como evitar y
tratar la enfermedades que se presentan.



La experiencia nos enseña
que la mejor manera
de criar animales
es previniéndoles
de las enfermedades.

Por lo tanto, debemos
tener en cuenta
ciertas prácticas y cuidados
sanitarios en la cría
de los pollos.


¡CLARO!

Además nos sale más económico y nuestras ganancias serán mayores.



Entre las principales prácticas preventivas tenemos:

- Asegurar una adecuada ventilación en el interior del galpón.



- Colocar viruta limpia, seca, sin astillas, trapos, plásticos o cáscaras.



- La cama debe ser adecuada y preparada con material grueso.
- Debemos lavar bien y desinfectar los bebederos y comederos.

- Debemos controlar las moscas, ratas, murciélagos, aves silvestres y domésticas.



- Debemos tener a disposición agua fresca y limpia tratada con cloro y VANODINE u otro desinfectante.




Tenemos que:

- Vacunar a los pollitos.



- Aplicar medicamentos siguiendo las indicaciones del producto o del promotor.



LAS ENFERMEDADES



Las principales enfermedades que afectan a la salud de los pollos durante la cría y engorde son:

1. NEW CASTLE

Esta enfermedad es la que en el campo se la conoce como LA BRINCONA.


Se llama NEW CASTLE según una ciudad en Inglaterra donde la enfermedad apareció por primera vez.



- Cuando le ataca a los pollitos, presentan síntomas de tipo nervioso, se ponen tristes, les da parálisis, se vuelven lentos en sus movimientos, tienen diarrea, no comen y respiran con dificultad.

LOS COMEDEROS

Sirven para colocar y distribuir bien el alimento.





Pueden ser:

1. Metálicos.
2. de caña guadúa.
3. llantas viejas.




Lo importante es que el alimento no se riegue o desperdicie.

Por eso debemos tener en cuenta que cada pollo necesita de 5 a 6 centímetros de espacio en el comedero.



Los comederos que se encuentran en el mercado, se utilizan 1 por cada 25 pollos.



También podemos colocar la vacuna en el agua que beben.

Preparada la vacuna la colocamos de la siguiente manera:



- Cada frasquito de vacuna para 100 pollos, se vierte en un litro de agua.

O sea que:

1 frasco en 1 litro de agua es para 100 pollos.

2 frascos en 2 litros de agua son para 200 pollos.

3 frascos en 3 litros de agua son para 300 pollos.



Y así continuamos preparando la vacuna según el número de pollos que tengamos.

2. COLERA, TIFOSIS, PULLOROSIS

Estas tres enfermedades son bien parecidas y se pueden presentar juntas.



Es muy difícil curar a los pollos que sufren de una de estas enfermedades; por eso es importante prevenirlas mediante la vacunación.

A la vacuna contra estas enfermedades se conoce como "La Triple" porque combate las tres enfermedades de una vez.

En el campo, a la cólera, la tifosis y la pullorosis se las conoce como curso verde, curso blanco o simplemente curso.






Cuando el cólera, la tifosis y la pullorosis atacan a los pollos los principales síntomas que se presentan son los siguientes:


- Alas caídas
- Diarrea de color blanca
- Diarrea de color verde
- O diarrea de color amarillo verdoso.

Debemos saber que de las 3 enfermedades la que más ataca es la pullorosis.

Para evitar que los pollos se enfermen, los vacunamos cuando estos tienen 21 días de nacidos.



Podemos utilizar la vacuna conocida como Coltiviar o Bacterina Aviar.



Aplicamos medio centímetro con una jeringuilla desechable debajo de la piel.



O sea que la vacuna viene lista y el cuidado que tenemos que tener es aplicarla por vía subcutánea, por ejemplo en el pliegue donde comienza el ala.


Pongamos un poco de atención a lo siguiente:

Las tres enfermedades no son muy frecuentes en nuestro medio, por lo que normalmente no estamos vacunando para prevenirlas.

Pero cuando se presenta ya no podemos vacunar.

¡CLARO!

Porque se nos mueren más rápido.



Entonces lo que hacemos es lo siguiente:

- Observamos los animales que presenten los síntomas de alguna enfermedad y los separamos.
- Según la enfermedad aplicamos los productos que sirven para tratar dicha enfermedad.



La mayoría de las enfermedades peligrosas son causadas por bacterias.

Un grupo importante de medicamentos que nos ayuda a tratar estas enfermedades son los antibióticos.



Los antibióticos son sustancias que matan las bacterias dentro del cuerpo de los pollos, les voy a presentar algunos antibióticos.

PRODUCTOS DE USO AVICOLA

Muchos son los productos pecuarios en la cría de pollos.

Sin embargo, debemos utilizar solo los necesarios y conocidos.

Siguiendo las recomendaciones de las casas comerciales


Así tenemos:

CLORTETRACICLINA


Es un antibiótico que sirve para la prevención y el tratamiento de los problemas respiratorios, así como de las infecciones intestinales.

Se utiliza disolviendo un sobre pequeño de 25 gramos en un balde mantequero (20 litros).

Una vez preparada el agua con el producto lo distribuimos en cada uno de los bebederos



Si el balde del agua no nos alcanza para colocar en los bebederos debido a que tenemos un gran número de pollos preparamos otro.



El tratamiento debe ser de 3 a 5 días seguidos

GALLIMICINA


Es un antibiótico para la prevención y tratamiento de todos los problemas respiratorios e infecciosos que se presentan en los pollos.

Según el caso se aplica un sobre de 10 gramos en un galón de agua.

O sea 1 sobre en 4 litros de agua.

El tratamiento debemos mantenerlo de 3 a 5 días seguidos.

En caso de tener un problema fuerte de infección intestinal o respiratorio, preparamos el sobre de 10 gramos en medio galón de agua, colocamos en los bebederos y les damos de 3 a 5 días seguidos



TYLO - TAD - PLUS

Es un antibiótico que sirve para todo tipo de problemas respiratorios.

Para la prevención de las enfermedades se disuelve 2 cucharaditas llenas de TYLO-TAD-PLUS en un balde mantequero y se les da el tratamiento durante 3 a 5 días.

En el caso de tener ya los problemas respiratorios, se disuelve 4 cucharaditas llenas de TYLO-TAD-PLUS, en un balde mantequero.

VANODINE

Es un producto desinfectante que contiene yodo.

Los podemos utilizar en algunos casos como:

DESINFECCION DE GALPONES

Para esto diluimos 60 centímetros de VANODINE para una bomba de 20 litros de agua y aplicamos en el techo, las paredes y el piso del galpón.

DESINFECCION DEL AGUA DE BEBIDA

En este caso diluimos 10 centímetros cúbicos de VANODINE en un balde mantequero y colocamos en cada uno de los bebederos.

TRIMETO TAD POLVO

Es un antibiótico para la prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias e infecciosas.

Se disuelve 10 cucharaditas a ras en un balde mantequero y se distribuye en los bebederos.

El tratamiento se lo mantiene de 3 a 5 días seguidos.

AVISOL


Es un concentrado vitamínico
que se los puede dar en el
agua de bebida.

Aplicamos una cucharadita
llena en un balde
mantequero durante 3 a 5
días seguidos.



SACRIFICIO DE POLLOS

Según el mercado,
se puede sacar a la
venta los pollos.
Se los puede vender
vivos o pelados.






En el caso de que se vendan como pollos vivos se debe pesarlos.


Se los acomoda en jaulas de caña partida para el transporte.


En el caso de los pollos pelados se los tiene que sacrificar y entregar limpios.



Para el sacrificio de los pollos necesitamos de ciertos materiales como:


Una estufa o fogón, mesas o tarimas, ollas grandes lavadero, canecas, baldes, cuchillos bien afilados, grandes y pequeños, tinas, hielo de ser necesario.






Para el sacrificio se necesitan algunas personas:

- Una persona para degollar, tener el agua caliente y meter los pollos.
- Según el número de pollos a pelar se necesitan las personas que se encargarán de desplumar.
- Por lo menos se requieren dos personas para abrir y sacar los intestinos así como para despicar.



Debemos tener en cuenta que para la venta de los pollos pelados, se debe hacer un sacrificio correcto, de esta manera entregamos pollos con buena presentación.



El pollo debe entregarse limpio, bien desplumado, sin sangre, despicado, uñas cortadas y molleja limpia.